

Instrucciones de preparación intestinal: Dulcolax/Golytely

Es muy importante que siga todas las instrucciones de preparación para su procedimiento. Su colon debe estar vacío para que el proveedor tenga visibilidad durante el procedimiento. Muchos pacientes sienten que la preparación intestinal es la parte más difícil del procedimiento.

Preparación para el procedimiento

- El día antes de su procedimiento, deberá comenzar a preparar su colon.
- No consuma ningún alimento sólido todo el día anterior.
- Utilizará la preparación intestinal Golytely para limpiar su colon.
- Se utiliza una preparación intestinal de dosis dividida porque los estudios han demostrado que es más tolerable para los pacientes y más eficaz para limpiar el colon, lo que permite al proveedor visualizar mejor los pólipos.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones. Si no sigue las instrucciones de manera correcta, es posible que deba cancelar su procedimiento.

Insumos que debe comprar

- Para el procedimiento, necesitará comprar algunos insumos para la preparación intestinal.
- **Se necesita una receta:**
 - Consulte con su farmacia y surta su receta de Golytely o su equivalente genérico.
- **No se necesita receta:**
 - Cuatro (4) tabletas de Bisacodyl/Dulcolax (5 mg). Asegúrese de que se puedan tomar por la boca/vía oral.
 - Paquetes de Crystal Light para ayudar a que la preparación sepa mejor (no use sabores color rojo ni morado). (Opcional)

Información sobre los medicamentos

Es posible que antes de su procedimiento sea necesario suspender o ajustar de manera temporal algunos de los medicamentos que toma de manera habitual

- Anticoagulantes
 - Como Coumadin (warfarina), Ticlid (clorhidrato de ticlopidina), Agrylin (anagrelida), Xarelto (Rivaroxaban), Pradaxa (Dabigatran), Pletal (Cilostazol), Brillinta (Ticagrelor), Eliquis (Apixaban), Effient (Prasugrel), Plavix. (Clopidogrel) y aspirina para adultos 325 mg. Si está tomando un anticoagulante o antiplaquetario que no este en esta lista, notifique al equipo gastrointestinal lo antes posible.
 - Debe hablar con el proveedor que le receta o con el especialista al menos 2 semanas antes del procedimiento programado. No suspenda estos medicamentos sin el consentimiento de su proveedor.
- Aspirina 81 mg (bebé)
 - Puede tomar su aspirina de 81 mg según lo prescrito con un sorbo de agua.
- Insulina y medicamentos para la diabetes
 - Llame al proveedor que controla sus niveles de glucosa. Es posible que sea necesario ajustar sus medicamentos debido a las restricciones dietéticas requeridas para el procedimiento. No suspenda estos medicamentos sin el consentimiento de su proveedor.
- Péptido-1 similar al glucagón (agonista de GLP-1)
 - Como Byetta (Exenatida), Saxenda (Liraglutida), Victoza (Liraglutida), Wegovy (Semaglutida), Trulicity (Dulaglutida), Bydureon (Exenatida), Mounjaro (Tirzepatida) o Rybelsus (Semaglutida).
 - Debe hablar con el proveedor que le receta o con el especialista al menos 2 semanas antes del procedimiento programado. No suspenda estos medicamentos sin el consentimiento de su proveedor.

Cinco (5) días antes de su procedimiento

- No tome medicamentos que detienen la diarrea.
 - Ejemplos: Imodium o Pepto-Bismol.
- No tome medicamentos o suplementos de fibra.
 - Ejemplos: Metamucil o Citrucel.
- No tome vitaminas ni suplementos. Las vitaminas y los suplementos dejan una capa en el colon, lo que dificulta que el proveedor vea pólipos más pequeños.
 - Ejemplos: multivitaminas, aceite de pescado, vitamina D, hierro o cúrcuma.

Tres (3) días antes de su procedimiento

- Comience una dieta baja en fibra. Una dieta baja en fibra ayuda a que la limpieza sea más efectiva.
- Algunos ejemplos de alimentos bajos en fibra incluyen:
 - Pan blanco, arroz blanco, pasta, galletas saladas, pescado, pollo, huevos, carne molida, mantequilla de maní cremosa, verduras cocidas/hervidas, frutas enlatadas, plátanos, melones, leche, yogur natural, queso, aderezos para ensaladas y otros condimentos.
- No coma alimentos con alto contenido de fibra como:
 - Palomitas de maíz, semillas (semillas de lino, girasol y quinoa), panes o pastas multigranos, nueces, granola, ensaladas, verduras crudas o frutas frescas y secas. Limite la cantidad de carnes.

Dos (2) días antes de su procedimiento

- Aumente su ingesta de agua.
- Continúe la dieta baja en fibra.

Un (1) día antes de su procedimiento

- Comience su dieta de líquidos claros.
- Solo beba líquidos claros durante todo el día anterior a su procedimiento.
- Una dieta de líquidos claros incluye:
 - Agua, café o té (sin leche ni crema), caldo claro o consomé, Gatorade, refrescos carbonatados o no carbonatados (Coca-Cola, Sprite), jugos de frutas colados sin pulpa (manzana, uva blanca, arándano blanco), Jell-O y paletas. **Recuerde, NO CONSUMIR LÍQUIDOS ROJOS O MORADOS.**
- No ingiera alimentos sólidos.
- A las 9 a.m., tome cuatro tabletas de Bisacodyl/Dulcolax. Se recomienda tener acceso a un baño después de tomar las tabletas.
- Mezcle todo el envase de Golytely y agítelo bien. Deje el Golytely en el refrigerador.
- Si prefiere beber la preparación a temperatura ambiente, puede sacarla del refrigerador a la 1 p.m.
- Puede agregar un paquete de crystal light a cada vaso para mejorar el sabor de la preparación.
- A las 4 p.m., comience a beber la preparación de Golytely. Beba un vaso de ocho onzas cada 15 minutos hasta que se haya terminado 2 litros (la mitad de la preparación). Le llevará de dos a tres horas para terminar de beberla.
- Necesitará estar cerca de un baño una vez que comience a beber la preparación. Tendrá diarrea y necesitará llegar rápidamente al baño.
- Algunas personas pueden sentir náuseas, sentir el estómago inflado o tener vómitos mientras beben la preparación intestinal. Si esto sucede, tome un descanso de 15 minutos y luego intente beber la preparación.
- Después de beber la mezcla de preparación, solo puede beber líquidos claros.
- Coloque el resto de la mezcla de preparación de Golytely en el refrigerador.

El día de su procedimiento

- **Cinco** horas antes de su colonoscopia, comience a beber los dos litros (la otra mitad del envase) de su mezcla de preparación. Beba un vaso de ocho onzas cada 15 minutos hasta que se haya terminado 2 litros (la mitad de la preparación). Le llevará de dos a tres horas para terminar de beberla.
- Puede agregar un paquete de crystal light a cada vaso para mejorar el sabor de la preparación.

- Querrá estar cerca de un baño una vez que comience a beber su mezcla de preparación. Tendrá diarrea y necesitará llegar rápidamente al baño.
- Algunas personas pueden sentir náuseas, sentir el estómago inflado o pueden vomitar mientras beben la preparación intestinal. Si esto sucede, tome un descanso de 15 minutos y luego intente beber la mezcla de preparación.
- Ya no debería formarse materia fecal, más bien esta será un líquido transparente o amarillo.
- Puede beber líquidos claros hasta dos horas antes de la hora de registro.
- Evite los líquidos rojos o morados, los productos lácteos, los batidos de proteínas, las bebidas alcohólicas, el tabaco de mascar y las drogas ilícitas. El consumo de estos productos resultará en la cancelación de su procedimiento.
- Puede tomar sus medicamentos con un sorbo de agua.
- Recuerde, no ingiera alimentos sólidos.
- Tal vez quiera considerar un poco de tiempo extra para llegar a su cita, ya que es posible que necesite detenerse y usar un baño en el camino.

Notas / Otras instrucciones: